

ialuset® Plus krém

Fertőzött és égett sebek kezelésére

Hialuronsav és ezüst-szulfadiazin alapú krém (25 g-os tubus)

ÖSSZETEVŐK

0,2% hialuronsav (nátriumsó formájában), és 1% ezüst-szulfadiazin.

Egyéb összetevők: olajsav-decilészter, ceteraril-alkohol, nátrium-lauril-szulfát és nátrium-ceteraril-szulfát, Makrogol, folyékony szorbitol, glicerin és víz.

TULAJDONSÁGOK

A hialuronsav a bőr egyik alapösszetevője. A gyógyulás minden fázisában fontos szerepe van. Felgyorsítja a gyógyulást, és a sérült bőr hámjának újraképződését. Nagy vízmegkötő képessége révén a szöveti újraképződési folyamatok számára kedvező nedves közeget biztosít. Az ialuset® Plus krémekben lévő hialuronsavat bio-fermentációval állították elő. Az ezüst-szulfadiazin összetevő erős antimikrobás hatással rendelkezik, leginkább a Gram-negatív baktériumok ellen.

JAVALLAT

Az ialuset® Plus fertőzött és égett seb kezelésére, bakteriális eredetű bőrbetegségekre, illetve olyan esetekben javasolt, amikor másodlagos fertőzés kialakulása könnyen bekövetkezhet.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA

A seb megtisztítása és fertőtlenítése után a krémet 2-3 mm vastagon közvetlenül a sebre kell tenni. Alternatív megoldásként a krémet a steril gézlapra lehet kenni, majd a gézlap sebre helyezése után a géz rögzítése a seb megfelelő kötözésével történik.

Minden kezelés előtt javasolt a seb fiziológiás oldattal történő megtisztítása. Naponta egyszer kell alkalmazni a teljes sebgyógyulásig. A krém tiszta csapvízzel lemosható.

A seb és égés gyógyulásának folyamatát az orvosnak kell értékelnie. A kezelés teljes ideje ne legyen több egy hónapnál.

NEM KÍVÁNT HATÁSOK

Ritkán előfordulhat helyi túlérzékenységi reakció, mint pl. ekcéma.

ELLENJAVALLATOK

Ismert általános vagy helyi túlérzékenység a szulfadiazinra (kontakt ekcéma).

Túlérzékenység bármely összetevőre.

Megfelelő adatok hiányában az ialuset® Plus használata ellenjavallt kétévesnél fiatalabb korban.

FORDULJON ORVOSHOZ VAGY GYÓGYSZERÉSZHEZ HA BÁRMILYEN NEM KÍVÁNT HATÁST TAPASZTAL, AKKOR IS HA AZ NEM SZEREPEL A FELSOROLÁSÁBAN.

ELŐZETES FIGYELMEZTETÉSEK

- A seb, az égés és a környező bőrterület tisztítására és fertőtlenítésére megfelelő módszert alkalmazzon! Az ialuset® Plus krém enzimes lemosókkal történő együtt használata nem került értékelésre.
- Ügyeljen, hogy az ialuset® Plus krémmel kezelt területet ne érje napfény (a fényérzékenység kockázata miatt)! Elszíneződés jelenhet meg a sebágyon, ami egyszerű lemosással eltávolítható.
- Vese- vagy májbetegség esetén nyílt seben ne alkalmazza!
- Gyermeknekél: az ialuset® Plus krémet fokozott óvatossággal alkalmazza kétévesnél idősebb gyermekeknekél. Orvosi javaslat nélkül a kezelés időtartama ne legyen hosszabb 15 napnál.
- Gyermekektől távol tartandó!
- Szájon át nem alkalmazható! Csak külsőleg!
- Minden használat után figyelmesen zárja vissza a kupakot! Alkalmazáskor a tubus nyílása ne érintkezzen közvetlenül a sebbel!

- Ne használjon sérült csomagolású terméket!
- A lejárt, vagy fel nem használt terméket ne dobja el. Vigye vissza a patikába, hogy a megsemmisítése megfelelő legyen.
- Terhesség és szoptatás: az ialuset® Plus krémet terhesség alatt és szoptató nők csak nagyon indokolt esetben használják.

AMENNYIBEN BÁRMILYEN KÉRDÉSE MERÜL FEL, BESZÉLJE MEG ORVOSÁVAL VAGY GYÓGYSZERÉSZÉVEL.

TÁROLÁSI FELTÉTELEK

NE HASZNÁLJA FEL A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETETT LEJÁRATI IDŐ UTÁN.

30°C alatti hőmérsékleten, fénytől védve.

A felbontás után 6 hónapon belül felhasználható.

A CE JELZÉS KIADÁS ÉVE: 2000

A TÁJÉKOZTATÓ UTOLSÓ ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA: 2018. JÚNIUS



GYÁRTÓ

Laboratoires Genevrier

280 rue de Goa – ZI les 3 Moulins

Parc de Sophia Antipolis

06901 Sophia Antipolis, Franciaország

Magyarországon a forgalmazásért felelős

IBSA Pharma Kft.

1124 Budapest, Fodor u 54/B Tel: (1) 225 7775



Figyelmeztetés – Olvassa el az előzetes figyelmeztetéseket a tájékoztatóban!



Tárolási hőmérséklet



Európai megfelelés jele

0344



Gyártó

LOT

Gyártási szám



Felhasználható